

Flumite® 200

Széles hatásspektrumú
atkaölő szer



A FLUMITE® HATÓANYAGA: 200 g/l diflovidazin

A FLUMITE® 200 ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI




- **Széles hatásspektrum:** fonállábú atkák, gubacsatkák és takácsatkák számos faja ellen sikerrel alkalmazható.
- **Szelektivitás:** csakis a növénykárosító atkákat pusztítja el, kíméli a hasznos szervezeteket. Méhekre nem jelölésköteles.
- Integrált növényvédelmi programba illeszthető.
- **Egyedi hatásmód:** gátolja az atkatojások kifejlődését, és a lárvák kikelését. Vedlésgátló hatásának köszönhetően el pusztítja a fiatal mozgó lárvákat és nimfákat.
- **Mélyhatás:** a levelek fonákán tartózkodó atkákra is hat.
- **Hosszú hatástartam:** a permetezést követően 40-60 napig védelmet biztosít.

A FLUMITE® 200 AJÁNLOTT ALKALMAZÁSA

A Flumite® 200 az atkatojásokat, a lárvákat, és a nimfákat pusztítja, ezért kijuttatásának optimális időpontja a kifejlett egyedek megjelenése előtt van. Megfelelő időzítéssel hosszú hatástartamot érünk el (lásd jobbra: almaültetvényben április közepétől akár július közepéig).

Megkésett kezelés esetén a kifejlett egyedek nagyobb arányban fordulnak elő az atkapopulációban, ezért a kifejlődést gátló szerek hatékonysága csökken. A taglózó hatású atkaölő szerek azonban főként csak a mozgó alakokat pusztítják (tojást kevésbé), ezért rövidebb hatástartammal rendelkeznek, ami a kezeléseket többszöri ismétlését teheti szükségessé.

Ha bármilyen oknál fogva megkéstünk a kezeléssel, akkor érdemes a Flumite® 200 és egy taglózó hatású atkaölő szer kombinációját alkalmazni, mely a fejlődő és a kifejlett egyedek ellen is hatásos, ezáltal teljes körű és hosszú hatástartamot érünk el.



FELHASZNÁLÁSA

KULTÚRA	KÁROSÍTÓ	KIJUTTATÁS IDŐZÍTÉSE	PERMETLÉ	
			FLUMITE (l/ha)	VÍZ (l/ha)
ALMATERMÉSŰEK (ALMA, KÖRTE)	Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi)	Kora tavasszal a tojások kelésekor, vesszők és gallyak 30 %-os fertő-zöttségekor	0,4-0,5	500-1000
	Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	Május végéig, 3-5 mozgó atka/levél küszöbérték elérésekor		
CSONTHÉJASOK (ŐSZIBARACK, NEKTARIN, SZILVA)	Csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeui)	Legkésőbb május végéig, 30 mozgó atka/levél küszöbérték elérésekor, 1 alkalommal	0,4-0,5	800-1000
	Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	3-5 mozgó atka/levél küszöbérték elérésekor, évi 1 alkalommal		
KÖSZMÉTE, PIROS ÉS FEKETE RIBISZKE, MÁLNA	Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	3-5 mozgó atka/levél küszöbérték elérésekor, virágzás előtt 1 alkalommal	0,4-0,5	500-600
SZEDER	Szederatka (Acalitus essigi)	Tavaszi növényvizsgálat alapján	0,5	500-600
SZAMÓCA	Szamócaatka (Phytonemus pallidus)	Szignalizáció alapján virágzás előtt, vagy a betakarítást követő időszakban	0,5	500-1000
FEKETE BODZA	Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	Virágzásig, 3-5 mozgó atka/levél küszöbérték elérésekor, évi 1 alkalom	0,4-0,5	500-800
	Levélatkák	Virágzásig, 30-40 atka/levél küszöb-érték elérésekor, évi 1 alkalom		
SZŐLŐ	Szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis), Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	Tavasszal szignalizáció alapján a szőlő 2-4 leveles állapotában	0,4-0,5	800-1000
	Szőlő gubacsatka (Colomerus vitis)	A virágzás előtti időszakban erős rügyfertőzés esetén (100-200 kifejlett egyed/csap)		
DIÓ	Szemölcsös gubacsatka (Eriophyes tristriatus), Nemeses gubacsatka (Eriophyes erineus)	Téli nyugalmi időszakot követően a rügyekben áttelelő kifejlett mozgó alakok ellen	0,5	800
DÍSZFAISKOLA, CSEMETE-KERT, KÖZTERÜLETI LOMB-HULLATÓ ÖRÖKZÖLD DÍSZFA, DÍSZCSERJE	Takácsatkák, levélatkák, laposatkák	Szignalizáció alapján a tömeges felszaporodás kezdetén	0,5	500-2000
HIBRIDKUKORICA	Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	Júliusban állománykezeléssel a kifejlett takácsatkák és lárvái ellen	0,3-0,4	600
SZÓJA, VETŐMAG ELŐÁLLÍTÁS	Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)	Legkésőbb a virágzás végéig a kifejlett egyedek és lárvái ellen	0,25-0,3	300

Szedemben, szamócában, fekete bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer hozzáadása javasolt.

A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott.

A készítményt gyümölcsösökben, bogyósokban, szőlőben, hibridkukoricában, szójában évente maximum egy alkalommal lehet felhasználni.

A Flumite® 200 és egy taglózó hatású szer kombinációja esetén a taglózó hatású szert az engedélyokirata által kultúránként előírt koncentrációban javasolt a munkaoldatba keverni. Tankkombináció készítése előtt keverési próba elvégzése ajánlott.

KISZERELÉS

- **III. forgalmi kategória:** 5 ml-es ampullákban, 100 ml-es flakonban, 200 ml-es flakonban
 - **II. forgalmi kategória:** 1 l-es flakonban
- Házikertekben 10 l permetlé elkészítéséhez 1 db 5 ml-es Flumite® 200 ampulla szükséges.

ÉLELMEZÉSEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 28 nap

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 0 nap

KEVERHETŐSÉG: lúgos kémhatású réz hatóanyagú gombaölőszerek kivételével valamennyi gomba-, és rovarölőszerrel keverhető.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Kapcsolat

GYÁRTJA AZ AGRO-CHEMIE KFT.

1225 Budapest, Bányalég u. 47-59.

www.agrochemie.hu

TEL. | +36 1 9000 800

FAX | +36 1 9000 810

EMAIL | info@agrochemie.hu



SZAKMAI TANÁCSADÁS

RADICS FANNY

Okleveles növényorvos

TEL. | +36 1 9000 831

EMAIL | fanny.radics@agrochemie.hu

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓ

MIHALEK ERZSÉBET

Belföldi értékesítés

TEL. | +36 1 9000 823

EMAIL | erzsebet.mihalek@agrochemie.hu