

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Agro-Chemie Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 47-59.)** ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a **6300/1571-2/2022 NÉBIH** számon kiadott végzést visszavonja, egyúttal a Magyarországon nem engedélyezett **Flumite 200 atkaölő permetezőszer** szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén őszibarack, nektarin, szilva, cseresznye, meggy, málna, szeder, köszméte, piros és fekete ribiszke, fekete bodza, közterületi díszfa, díszcserje, díszfaiskola, csemetekert, hibridkukorica és vetőmag előállítás céljából termesztett szója kultúrákban összesen 2500 hektáron különböző takácsatkák és gubacsatkák ellen földi permetezéses kijuttatással

2022. július 1-től 2022. szeptember 30-ig

engedélyezi.

A készítmény felhasználása a termelők saját felelősségére az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

Flumite 200 (200 g/l diflovidazin) atkaölő permetezőszer.

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint:



GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H mondatok):

H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
-------------	--

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok):

P102	Gyermeektől elzárva tartandó
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Felhasználható a termelők saját felelősségére:

- *csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva, cseresznye, meggy)* a csonthéjasok levélatkája, a közönséges és a piros gyümölcsfa-takácsatka ellen *kizárólag betakarítás után*, 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, egy alkalommal.
- *köszmétében, piros és fekete ribiszkében, málnában* közönséges takácsatka ellen *kizárólag betakarítás után* 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével egy alkalommal.
- *szederben* a szederatka ellen növényvizsgálat alapján *kizárólag betakarítás után* 0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével egy alkalommal.
- *fekete bodzában* közönséges takácsatka és bodza-levélatka ellen *kizárólag betakarítás után* 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-800 l/ha permetlével. Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer hozzáadása javasolt. A készítményt egy alkalommal lehet felhasználni.
- *díszfaiskolában, csemetekertben, valamint közterületi lombhullató és örökzöld díszfa és díszcserje* fajokon károsító takács-, levél- és lapos atkák ellen előrejelzés alapján a tömeges felszaporodás kezdetén 0,5 l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott.
- *hibridkukoricában* állománykezeléssel a közönséges takácsatka kifejlett alakjai és lárvái ellen évi egy alkalommal 0,3-0,4 l/ha dózisban, 600 l/ha permetlével.
- *szójában vetőmag előállításban* virágzást követően közönséges takácsatka kifejlett egyedei és lárvái ellen növényvizsgálattal végzett előrejelzés alapján évi egy alkalommal 0,25-0,3 l/ha dózisban, 300 l/ha permetlével.

Szederben, fekete bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer hozzáadása javasolt.

A készítményt gyümölcsösökben, hibridkukoricában, vetőmag szójában évente maximum egy alkalommal lehet felhasználni.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

*Csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva, cseresznye, meggy), bogyósokban (málna, szeder, köszméte, piros és fekete ribiszke, fekete bodza), **betakarítás után** történő felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása **nem szükséges**.*

*Vetőmag előállítású szójában és hibridkukoricában előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. **A kezelt növényt élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni! A termés kizárólagosan vetőmagként forgalmazható.***

Díszfaiskolában, csemetekertben, közterületi lombhullató és örökzöld díszfa és díszcserjékben előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. Gondoskodni kell a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Személyi védőfelszerelés

Előkészítőnek, kijuttatónak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés!

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

A kiszerelés térfogata/tömege: 1,0 literes, 0,2 literes, 0,1 literes, 5×5 ml és 1×5 ml ampullás kiszerelés. Kis kiszerelésű egységek címkéjén a szója és hibridkukorica kultúra jelölése nem kötelező.

Forgalmazási kategória: II. az 1,0 literes kiszerelésnél

Forgalmazási kategória: III. az 1×5 ml és 5×5 ml-es ampullás és 0,1 l, 0,2 l kis kiszerelésű egységeknél, házi kerti felhasználás céljára.

A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

A növényvédő szer csak a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba. Az eltérő forgalmazási kategóriájú készítményeket azonos címketartalommal kell felcímkézni.

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után, legkésőbb 2022. december 31-ig a kérelmező köteles a maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, valamint a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A gyártó a jelen határozat alapján köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről az engedélyező hatóság részére legkésőbb 2022. október 31-ig jelentést készíteni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon